DLP 23-6-86073706

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA
C.C.P. Montpellier 5238-57

GRANDES CULTURES

N° 4 - 27 mai 1986

LUZERNE A GRAINES

(en collaboration avec la FNAMS et les SUAD de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

CECIDOMYIES : PROTÉGEZ LA FLORAISON SYTÉMATIQUEMENT

Sur l'ensemble du réseau, en raison des conditions climatiques chaudes qui ont fait évoluer rapidement la végétation, les parcelles installées non précoupées, atteignent ou vont atteindre très rapidement le stade sensible boutons verts, à ce ravageur.



Inflorescences entièrement vertes, réceptives aux pontes.

pédoncule ⩾ 1 cm

Aspect d'une tige présentant des inflorescences au stade sensible

Inflorescence au stade sensible

Seuil optimal d'intervention : 20% des tiges avec en moyenne une inflorescence differenciée (pédoncule ⩾ 1 cm).

.../...

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42




Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Le Directeur, M. FREYDIER - N° d'inscription 531 AD

P6

TRAITEZ à l'aide du fenvalerate à 30 g/ha (SUMICIDIN 10 à 0,3 l/ha), classé "non dangereux pour les abeilles" dans les conditions d'emploi prescrites, mais pour éviter tout risque sur les insectes pollinisateurs, réalisez le traitement en soirée, ce qui renforce d'ailleurs sur efficacité sur cecidomyies.

RENOUVELEZ le traitement 12 à 15 jours après ce qui permet de protéger l'essentiel des boutons floraux fertiles.



Evolution du bourgeonnement et position des deux traitements préventifs contre la Cécidomyie.

PHYTONOMES - APIONS

Ces ravageurs sont encore présents dans quelques situations à un niveau supérieur au seuil de nuisibilité.

Pour les zones les plus tardives ou sur parcelles précoupées n'ayant pas encore de boutons floraux,

TRAITEZ à l'aide d'une spécialité contenant du :

- lindane à 400 - 600 g/ha
- méthidathion à 300 g/ha (Ultracide 20)

Pour les luzernes au stade boutons verts, le Sumicidin sera également efficace contre ces ravageurs.

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX - MONTPELLIER 1986